

CRISE D'ASTHME - AGIR

Toux	Essoufflement	Sifflement	Oppression thoracique	Ou tous ces signes
------	---------------	------------	-----------------------	--------------------

NOM

PRÉNOM

PERSONNE À CONTACTER

TÉL



Jamais banale, une crise d'asthme
peut être une urgence vitale

CRISE D'ASTHME - 5 RÈGLES À SUIVRE

- 1** Prenez 2 bouffées de votre bronchodilatateur immédiatement (inhalateur généralement bleu)
- 2** Asseyez-vous bien droit et restez calme
- 3** Respirez lentement et régulièrement
- 4** S'il n'y a pas d'amélioration : reprenez 2 bouffées de votre bronchodilatateur. Si la crise persiste :
=> jusqu'à 10 bouffées toutes les 20 minutes (3 fois en 1 heure) pour l'adulte ou l'adolescent
=> jusqu'à 5 bouffées toutes les 20 minutes (3 fois en 1 heure) pour l'enfant de moins de 6 ans
S'il n'y a pas d'amélioration, prendre le corticoïde prescrit par le médecin
- 5** Appelez le 15 ou le 112
RÉPÉTEZ LA RÈGLE 4 SI LES SECOURS N'ARRIVENT PAS EN 10 MINUTES

**NE VOUS RENDEZ PAS À L'HÔPITAL PAR VOS PROPRES MOYENS.
ATTENDEZ LES SECOURS**